

Mankietowe wycięcie żołądka w leczeniu otyłości patologicznej - załącznik do świadomej zgody na wykonanie operacji

Imię nazwisko pacjenta _____ Bydgoszcz, dnia

Zostałem poinformowany o możliwości wystąpienia następujących ważnych powikłań śród- i pooperacyjnych

1. W trakcie operacji może wystąpić uszkodzenie narządów wewnętrznych brzucha (żołądek, jelita, śledziona, nerka, trzustka), co może skutkować powstaniem krwawienia wewnętrznego, wycieku treści żołądkowo- jelitowej lub zaburzeniem pracy tych narządów

Podpis pacjenta:.....

2. Powstanie uszkodzenia narządu wewnętrznego może spowodować konieczność usunięcia częściowego lub całkowitego narządu lub też jego rekonstrukcję oraz wymusić konieczność zamiany metody operacyjnej z laparoskopowej na otwartą

Podpis pacjenta.....

3. Po operacji groźnym powikłaniem jest powstanie nieszczelności w miejscu przecięcia i zeszytie żołądka; wystąpienie tego powikłania zagraża zdrowiu i życiu

Podpis pacjenta:.....

4. Nieszczelność ta może wystąpić tuż po zabiegu operacyjnym w pierwszych dniach, ale również do tygodnia po zabiegu lub nawet później

Podpis pacjenta:..

5. Powstanie nieszczelności i zacieku treści żołądkowej do brzucha powoduje konieczność podjęcia leczenia - może być to postępowanie operacyjne lub długotrwałe leczenie zachowawcze

Podpis pacjenta:.....

6. Operacja żołądka może być przyczyną powstania zakrzepów w żyłach oraz ich przemieszczania do serca i płuc; zabiega temu branie leków p-krzepliwych, opaski uciskowe na nogi, podłączenie do pompy zapobiegającej spowolnieniu krążenia krwi w żyłach nóg oraz wczesne wstanie z łóżka po operacji

Podpis pacjenta:.....

7. Po operacji mogą być zaburzenia opróżniania żołądka i zaleganie treści pokarmowej oraz zarzucanie jej do przełyku

Podpis pacjenta:.....

8. Operacja mankietowego wycięcia żołądka sama przez się nie zapewnia automatycznie chudnięcia; wymagane są ograniczenia dietetyczne, aktywność fizyczna i lekarskie badania kontrolne

Podpis pacjenta:.....

9. Brak kontrolnych badań laboratoryjnych krwi oraz suplementacji witamin i składników mineralnych może być przyczyną poważnych pooperacyjnych zaburzeń ogólnoustrojowych

Podpis pacjenta:.....