

Mankietowe wycięcie żołądka w leczeniu otyłości patologicznej - załącznik do świadomej zgody na wykonanie operacji

Imię nazwisko pacjenta \_\_\_\_\_ Bydgoszcz, dnia.....

*Zostałem poinformowany o możliwości wystąpienia następujących ważnych powikłań śród- i pooperacyjnych:*

1. *Przy znacznej otyłości mogą wystąpić trudności ze znieczuleniem pacjenta np. z powodu niemożliwości intubacji (wprowadzenia rurki do tchawicy). Wówczas odstępuje się od operacji. Pacjent ponosi koszty pobytu na sali operacyjnej (anestezjolog, pielęgniarki, zużyty sprzęt medyczny, leki, czas zajęcia sali operacyjnej)*

*Podpis pacjenta: .....*

2. *W trakcie operacji może wystąpić uszkodzenie narządów wewnętrznych brzucha (żołądek, jelita, śledziona, nerka, trzustka), co może skutkować powstaniem krwawienia wewnętrznego, wycieku treści żołądkowo-jelitowej lub zaburzeniem pracy tych narządów*

*Podpis pacjenta: .....*

3. *Powstanie uszkodzenia narządu wewnętrznego może spowodować konieczność usunięcia częściowego lub całkowitego narządu lub też jego rekonstrukcję oraz wymusić konieczność zamiany metody operacyjnej z laparoskopowej na otwartą*

*Podpis pacjenta: .....*

4. *Po operacji groźnym powikłaniem jest powstanie nieszczelności w miejscu przecięcia i zeszytce żołądka; wystąpienie tego powikłania zagraża zdrowiu i życiu*

*Podpis pacjenta: .....*

5. *Nieszczelność ta może wystąpić tuż po zabiegu operacyjnym w pierwszych dniach, ale również do tygodnia po zabiegu lub nawet później*

*Podpis pacjenta: .....*

6. *Powstanie nieszczelności i zacieku treści żołądkowej do brzucha powoduje konieczność podjęcia leczenia - może być to postępowanie operacyjne lub długotrwałe leczenie zachowawcze*

*Podpis pacjenta: .....*

7. *Operacja żołądka może być przyczyną powstania zakrzepów w żyłach oraz ich przemieszczania do serca i płuc; zabiega temu branie leków p-krzepliwych, opaski uciskowe na nogi, podłączenie do pompy zapobiegającej spowolnieniu krążenia krwi w żyłach nóg oraz wczesne wstanie z łóżka po operacji*

*Podpis pacjenta: .....*

8. *Po operacji mogą być zaburzenia opróżniania żołądka i zaleganie treści pokarmowej oraz zarzucanie jej do przełyku*

*Podpis pacjenta: .....*

9. *Operacja mankietowego wycięcia żołądka sama przez się nie zapewnia automatycznie chudnięcia; wymagane są ograniczenia dietetyczne, aktywność fizyczna i lekarskie badania kontrolne*

*Podpis pacjenta: .....*

10. *Brak kontrolnych badań laboratoryjnych krwi oraz suplementacji witamin i składników mineralnych może być przyczyną poważnych pooperacyjnych zaburzeń ogólnoustrojowych*

*Podpis pacjenta: .....*